Горловский Медиа Портал
29.03.17 08:31

Заболевание является распространенной причиной дискомфорта в интимной зоне.

Важно знать, что такое молочница и как она выглядит , какие вызывает осложнения.

Симптомы

Молочница относится к грибковым инфекциям, её второе название – кандидоз. Первые признаки: зуд слизистых, покраснение половых губ, жжение, усиливающееся при мочеиспускании и во время полового акта. Болезненные ощущения становятся ярко выраженными при воздействии тепла на организм: во время посещения сауны, принятия ванны, в жарком помещении.

У женщин симптомы чаще появляются перед началом менструации из-за снижения местного иммунитета, могут быть приняты за аллергию на средства гигиены. Мужчины из-за анатомических особенностей редко замечают первые признаки. При развитии инфекции у них повышается либидо из-за раздражения нервных окончаний симптомами заболевания. Сам половой акт вызывает болезненные ощущения и не приносит эмоциональной разрядки.

На ранней стадии заболевание сложно диагностировать без анализа флоры мазка, через несколько дней появляются характерные для молочницы выделения:

Белого цвета, при засыхании появляется желтоватый оттенок. Зеленый, розовый, темно-серый возможны только в случае присоединения других гинекологических заболеваний.

Творожистой консистенции, крупинки легко удаляются с кожи.

Внешне похожие на свернувшееся молоко, вначале они почти не имеют запаха. При обильности выделений он становится кисловатым, напоминает кефирный.

Если лечение отсутствует, творожистые выделения поражают внутренние стенки влагалища, внешние слизистые, мочевыводящий канал. Образования становятся более плотными, превращаются в сероватую пленку. Она трудно отделяется, оставляя после себя повреждения кожи, кровоточивость.

Последствия

- Молочница опасна возможными осложнениями:
- Нарушение менструального цикла, изменение количества выделений во время месячных.
- Воспаление внутренних половых органов, эрозия шейки матки.
- Переход в хроническую форму с периодическим затиханием и обострением симптомов.
- Снижение общего иммунитета, появление инфекции на слизистых полости рта, в кишечнике.

Кандидозный пиелоцистит – сопровождается присоединением других патогенных возбудителей, вызывает боли в области почек и мочевого пузыря.

Кандидозный уретрит – инфекционное поражение мочевыводящего канала. Больше о

кандидозном уретрите можно узнать на сайте Gribkanet .

Женское и мужское бесплодие при затяжном течении заболевания.

Для беременных – риск преждевременных родов, внутриутробного инфицирования плода, его гибели. Если женщина заболела перед родами, возможно заражение ребенка при прохождении через родовые пути, опасное для неокрепшего организма.

У мужчин возникает фимоз – сужение крайней плоти, приводящее к болезненному извлечению головки.

В запущенных случаях у мужчин возможно развитие простатита – воспаления предстательной железы, и везикулита – инфекционного поражения семенных пузырьков.

Избежать осложнений поможет обращение к гинекологу при первых признаках дискомфорта и своевременное лечение молочницы.