



Не стоит (или все же стоит) напоминать, что перед употреблением любого препарата, следует внимательно прочитать его инструкцию. В идеале - нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Это касается и лекарств, которые используют для лечения вирусного гепатита С (ВГС) в его острой или хронической форме. Если еще недавно врачи назначали интерфероновую терапию, то сейчас на современном фармацевтическом рынке есть огромный выбор самых разных препаратов и кто-то может решить заняться самолечением.



В чем принцип действия активных веществ на вирус гепатита С

В состав многих инновационных препаратов входят такие активные вещества, как Софосбувир и Даклатасвир. Они способны безапелляционно бороться с вирусом и уже очень быстро его процентное содержание в крови резко падает. Наблюдается неукоснительная тенденция - он уничтожается и совсем исчезает из организма, прекращая разрушать печень и другие внутренние органы. В инструкции Софосбувира и Даклатасвира говорится об их происхождении и дозах, которые можно принимать ежедневно.

Временной промежуток между приемами препаратов, в состав которых входят Софосбувир и Даклатасвир, должен быть не менее 18 часов. В идеале - 24 часа. Для этого, говорится в [инструкции по применению Софосбувира и Даклатасвира](#), нужно выбрать одно удобное для вас время и придерживаться его на протяжении всего терапевтического курса.

О чем расскажет инструкция

Открытие Софосбувира и Даклатасвира стало важным событием для людей, которые пострадали от ВГС С. Эти активные вещества входят в состав индийских дженериков - это бюджетный вариант дорогостоящих американских оригиналов. Инструкция Софосбувира и Даклатасвира содержит информацию о противопоказаниях. Их наличие объясняется тем, что еще не до конца изучено влияние этих веществ на организм определенной категории пациентов. Так, инструкция по применению Софосбувира и

Даклатасвира содержит запрет на прием препаратов лицам в возрасте до 18 лет. Табу на их прием касается и будущих мам, кормящих грудью женщин. Последним рекомендуется переводить ребенка на искусственное вскармливание.

Назначение препаратов, в состав которых входят Софосбувир и Даклатасвир, должен делать врач-инфекционист, гепатолог или терапевт, который наблюдает пациента и имеет соответствующий опыт лечения ВГС. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и само назначением. Врач учитывает множество факторов при составлении индивидуальной схемы терапии, умело рассчитывает дозировку. Он также сможет предупредить о возможных побочных действиях дженериков.

В инструкции Софосбувира и Даклатасвира говорится о том, что иногда появляется головная боль, отечность, зуд или беспричинная утомляемость. Но это можно пережить, если знать о том, какой комплекс побочных действий вызывала интерфероновая терапия - пациенты в 80% случаев уже через 2-3 недели от нее отказывались. Инструкция по применению Софосбувира и Даклатасвира есть на сайте нашей компании, и мы предлагаем ее детально изучить. На все вопросы, относительно препаратов и их комбинаций может ответить наш онлайн-специалист.

Подробная информация на сайте <http://gepa-net.com>