



Перебои с поставками АКДС (комбинированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка) начались еще в декабре. Донецким медикам, как и в аналогичном случае с вакциной БЦЖ, пришлось вновь прибегнуть к переписке с чиновниками из МОЗ. И на этот раз пока безрезультатно. С начала года в регион не было ни одной поставки такого необходимого препарата.

- Ситуация с вакциной АКДС на сегодня в области сложилась довольно напряженная. Хотя, по нашим данным, еще ни из одного района или города не было сообщений о приостановлении иммунизации. Однако наши старые запасы на грани исчерпания,

- констатировала

**заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой области
Тамара Беломеря**

. —

Посудите сами, на первое марта в области было 12 000 доз вакцины. При этом средняя потребность только на месяц составляет порядка 15 000 доз.

Эпидемиологи заверяют, что пока в Донецкой области довольно благополучная ситуация по таким вакциноуправляемым заболеваниям, как коклюш, дифтерия, столбняк. Но если периоды перебоев с поставками АКДС будут затягиваться (а плюс к этому, еще и родители будут отказываться прививать своих детей), в обществе накопится незащищенная прослойка.

- Это естественно приведет к подъему заболеваемости, - предупреждает **Тамара Беломеря**

. —
О крайностях пока речь не идет. Но уже в течение этого—следующего годов при таких условиях мы сперва будем иметь отдельные случаи заболевания, а потом и эпидемическое распространение.

В Минздраве же тем временем обещают, что поставки возобновятся уже в апреле. Но не раньше, чем примут госбюджет.

Справка: Есть ряд детских недугов, легкомысленное отношение родителей к которым может закончиться трагически. В частности, дифтерия сопровождается серьезнейшими осложнениями, которые отражаются на сердечно-сосудистой и нервной системах, почках - миокардит, токсическая полинейропатия, нефрозонефрит. Кроме того, может стать толчком для развития паратонзиллярного абсцесса, отита, воспаления легких.

Коклюш - передается воздушно-капельным путем, наиболее восприимчивы дети 1-7 лет,

особенно тяжело протекает у малышей до года. При тяжелом течении возникают горловые кровотечения, кровоизлияния в склеру, судороги, остановки дыхания. Возможны осложнения в виде пневмонии.

При столбняке из-за мышечного спазма и застойных явлений могут развиваться бронхит, пневмония, инфаркт миокарда, сепсис, разрывы мышц и сухожилий, тромбоз вен, эмболия лёгочных артерий, отек легких и т.д. Очень высокая летальность.

Основной метод профилактики этих заболеваний вакцинация, которую проводят (по принятому МОЗ графику) в 3,4,5 и 18 месяцев.

Источник: Donetsk.proUA