



Закупорка тромбом сосудов мозга и сердца чревата летальным исходом. Тромб в сосуде, питающем головной мозг или сердце, препятствует кровоснабжению. Инсульт и инфаркт миокарда до сих пор остаются грозными и опасными осложнениями гипертонической болезни и церебрального атеросклероза, после которых выживший пациент становится глубоким инвалидом. Находясь в полном сознании, человек не в состоянии полноценно двигаться, обслуживать себя, вести привычный образ жизни. Медики считают: основная проблема лечения такого заболевания – позднее обращение за медицинской помощью. Наиболее эффективный и до настоящего времени единственный утвержденный лечебный подход заключается в проведении тромболитической терапии. Метод тромболизиса – это своеобразное спасение утопающего... Суть тромболизиса заключается в том, что больному вводится вещество-тромболитик, растворяющее тромб внутри пораженного сосуда. Принятая в Горловке программа по предупреждению и лечению сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 2004-2013 годы дает положительный результат.

Уменьшилась смертность от инсультов и инфарктов миокарда по городу, улучшилось качество жизни больных. Горловка - один из немногих городов, который успешно внедряет на практике тромболитическую терапию на базе горбольницы №1.

В кардиологическом отделении ГБ №1 такой метод лечения внедрен с 2004 года. Всего к настоящему времени выполнено 522 тромболизиса больным с острым инфарктом миокарда. Все пациенты довольны результатами. В настоящее время он проводится препаратами стрептокиназы, фармакиназы, актилизе. Отделения больницы снабжены необходимой аппаратурой, позволяющей проводить мониторинг жизненно важных функций пациента во время проведения тромболизиса. Часть лекарства при этом вводится струйно(болюсно) в вену, остальная – капельно. Это позволяет быстро восстановить кровоток и остановить неврологические и кардиологические расстройства. Метод позволяет спасти не только жизнь человека, но и предотвратить инвалидность, восстановить качество жизни.

С 2011 года по инициативе главного врача городской больницы №1 Иванникова В.Л. метод тромболизиса используют в лечении ишемического атеротромботического инсульта. Выполненные процедуры, все с положительным эффектом, регресс симптоматики отмечался сразу при струйном введении препарата. С целью дальнейшего внедрения новых высокотехнологичных методов лечения больных на базе городской больницы №1 в январе 2013 года был открыт Центр сосудистой помощи (ЦСП) для неврологических и кардиологических больных на 12 коек. Центр финансируется не только из местного бюджета, но и по целевой программе из государственного, что позволило приобретать тромболитический препарат (учитывая его стоимость) не за

средства пациента и сделало тромболизис доступным видом терапии для населения города. Следует отметить, в связи с коротким терапевтическим окном (для больных с инфарктом миокарда - в первые 6 часов; для больных с ишемическим инсультом - 3 часа) количество пациентов, которые могут получить этот вид лечения, невелико. Для поднятия информированности населения о симптомах и последствиях инсульта и инфаркта сердца, широко используются местные СМИ: записываются выступления на местном телевидении, публикуются статьи в газетах. Прочитать эту информацию можно и на сайте больницы (<http://www.c2n.info/40007>). К тому же, в центрах сосудистой помощи все врачи прошли подготовку проведения тромболизиса, сотрудники скорой помощи информированы о сроках доставки пациентов, проводится усовершенствование лабораторной и инструментальной диагностики.

Следует отчетливо понимать, что необоснованный отказ пациента от проведения тромболитической терапии лишает его одного из самых эффективных способов лечения.

"Горловский Медиа Портал"